

चलने से संबंधित समस्या (Disorderly Gait)

चलना (Gait) एक इतनी सामान्य क्रिया है कि हमारा कभी उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ब्रेन के कई भाग आपस में तालमेल करके हमारा खड़ा होने का तथा चलने का संतुलन बनाते हैं। मस्तिष्क के वह भाग जो चलने में सहायता करते हैं, वह इस प्रकार है –

1. मस्तिष्क का उपरी भाग (Cerebellum, Paraventricular region and Cortex)
2. संतुलन की नसें (Vestibular nerves)
3. स्पाइनल कार्ड (Spinal cord)
4. पैर की नसें (Peripheral nerves)

चलने में कठिनाई के लक्षण इस प्रकार हैं –

1. पैर लड़खड़ाना जैसे शराबी चलता है। (Ataxia)
2. कदम छोटे हो जाना। (Short stepping)
3. जमीन से पैर का कम उठना। (Dragging of feet)
4. जमीन से पैर का अत्याधिक उठना। (High stepping gait)
5. जहां पैर रखना है वहाँ नहीं रखना। (Leg In-coordination)
6. चलते-चलते एकतरफ फिका जाना (Drifting to one side or sudden veering)
7. चाल धीमी हो जाना (Slow Gait)

सामान्य रूप से यह बीमारी 50 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू होती है और इसमें रोगी के गिरने की संभावना बढ़ जाती है।

इस बीमारी के निम्नलिखित कारण हैं –

1. नसों में खून जम जाना। (Clot in Brain)
2. मस्तिष्क में पानी भर जाना (NPH)
3. पार्किन्सन रोग (Parkinson's Disease)
4. पार्किन्सन जैसा रोग (Parkinson's disease look alike)

5. ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumor)
6. सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस (Cervical Spondylosis)
7. पैर की नसों में कमजोरी (Neuropathy)
8. थायराइड की बीमारी। (Hypothyroidism)
9. संतुलन की नसों की बीमारी (Bilateral Vestibulopathy)
10. शराब की वजह से नसों का खराब हो जाना। (Alcoholic cerebellar Degeneration)
11. अन्य बीमारी जैसे विटामिन बी 12 की कमी (B₁₂ deficiency)

उपचार (Treatment) — सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि रोगी को किस कारण से चल नहीं पा रहा है। अदांज से बिना कारण जानें रोगी का उपचार नहीं किया जा सकता हैं। अगर ब्रेन की नसों में पानी भर गया है तो उसका उपचार आपरेशन से होता है।

जाँचें (Investigation) —

1. **एम आर आई (MRI)** — इस बीमारी की मुख्य जांच एम आर आई (MRI) है। इस जांच से ब्रेन की कई मुख्य बीमारियां की जानकारी मिलती है। जैसे ब्रेन में थक्का (Clot) बन जाना, ब्रेन में पानी भर जाना (NPH), ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumor) होना आदि।
2. **रक्त की जांचें** — थायराइड हार्मोन तथा विटामिन बी 12 की जांच (Thyroid Test {TSH} and Vitamin B₁₂ Estimation)
3. **पैरों की नसों की जांच (Nerve Conduction Study)**
4. **संतुलन की नस की जांच (ENG Test)** आदि।

रोगी के उपचार का प्रमुख अंग चलने का व्यायाम है (Gait Retraining)। व्यायाम की सी.डी. (CD) उपलब्ध है।

चलने से संबंधित व्यायाम (Disorderly Gait Exercise)

संतुलन हेतु व्यायाम – (Balancing Exercise)

1. एक पैर पर खड़े होना। (Standing on one leg) 5 से 10 सेकेन्ड
2. चारों हाथ पैरों पर घोड़े की मुद्रा में होना (Quadruped standing) तथा एक हाथ को ऊपर उठाये, कमर स्थिर रखें। 5 से 10 सेकेन्ड
3. चारों हाथ पैरों पर घोड़े की मुद्रा में रह (Quadruped standing), एक हाथ तथा दूसरी ओर के पैर को ऊपर उठाये। 5 से 10 सेकेन्ड
4. कदम साइड से रखकर खड़े होना। (Standing – step to the side) 5 से 10 सेकेन्ड
5. कदम सामने रखकर खड़े होना। (Standing – step in front)
6. कदम पीछे रखकर खड़े होना। (Standing – step back)
7. पैर क्रॉस करके खड़े होना। (Standing cross over step)
8. सीढियों चढ़ें (Climbing Stairs) तथा ऊँची, नीची जगह पर चलें। (Walking over uneven ground) 5 से 10 स्टेप्स

गिरने से बचने के लिये व्यायाम – (Steps to prevent falling)

9. लेटकर घुटने मोड़ लें, अब दौनों घुटनों को दायी ओर एवं बायी ओर मोड़ लें। (Supine lying – knees bended – rotate the knees to the right and left side)
10. लेटकर दौनों हाँथों को पीछे की ओर ले जायें। (Lift the arm in the direction of the head) 5 से 10 सेकेन्ड

सभी व्यायाम दिन में तीन बार करें तथा एक व्यायाम 5 से 10 बार करें।